

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 18-5-79104534

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg - B.P. 210
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX
C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 243

15 MAI 1979

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

/ARBRES FRUITIERS/

Les températures élevées que nous connaissons depuis une semaine ont permis un accroissement très rapide de la végétation : d'importantes surfaces végétatives ne sont pas protégées. Par ailleurs, les premières taches de tavelures ont été observées dans différents vergers notamment sur pommiers. En conséquence, il est conseillé d'effectuer une nouvelle intervention cette semaine et de toute façon avant les prochaines pluies.

OIDIUM DU POMMIER

Sur les arbres négligés et de variétés sensibles, les pousses oïdiées sont déjà nombreuses. Il convient pour les variétés sensibles d'ajouter à la bouillie destinée à combattre la tavelure un produit actif contre l'oïdium.

ARAIGNEES ROUGES

Depuis une semaine, avec les températures élevées, l'éclosion des oeufs d'hiver a été rapide et une intervention s'avère maintenant nécessaire dans les vergers où les populations sont importantes. Il est donc recommandé de réaliser des observations afin de savoir si l'intervention se justifie à l'échelon du verger. Le traitement éventuel pourra être réalisé en même temps que celui dirigé contre la tavelure.

Si la floraison n'est pas terminée, il sera nécessaire de choisir un acaricide reconnu non dangereux pour les abeilles. Pour ce premier traitement il est préférable d'utiliser soit le TETRASUL (Animert V 101) : 40, soit l'AMITRAZ (Tudy ou Maïtac 20) : 60. Les doses sont exprimées en grammes de matière active par hectolitre d'eau.

Le TETRASUL permet de détruire les larves ainsi que les oeufs d'hiver qui ne sont pas encore éclos tandis que l'AMITRAZ présente une action très intéressante vis-à-vis des psylles.

PUCERONS - CHENILLES - PSYLLES

Ces ravageurs continuent d'être observés mais les populations sont extrêmement variables d'un verger à un autre. Il est donc nécessaire de poursuivre les observations afin d'intervenir le cas échéant.

Pour les psylles il est également conseillé de se reporter aux indications données dans le Bulletin Technique de la Station d'Alertes Agricoles "CENTRE" du 4 Mai.

DIDYMELLA DU FRAMBOISIER

La végétation a été très active depuis une semaine : un nouveau traitement s'impose donc.

/Ingénieur en Chef d'Agronomie

Chef de la Circonscription Phytosanitaire "CENTRE",

G. BENAS